

QUANTITATIVE BESTIMMUNG
DER
GALAKTOSE
MITTELS GALAKTOSEOXYDASE
AUS
DACTYLIUM DENDROIDES

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
zu Erlangen-Nürnberg

vorgelegt von
Jürgen Zapf
aus Bad Aibling



Dekan: Prof. Dr. Dr. G. Steinhardt

Referent: Prof. Dr. Dr. F. May

Tag der mündlichen Prüfung: 15. Oktober 1965

**Quantitative Bestimmung der Galaktose mittels Galaktoseoxydase
aus *Dactylium dendroides*, I**

Von

Werner Fischer und Jürgen Zapf

Quantitative Bestimmung der Galaktose mittels Galaktoseoxydase* aus *Dactylium dendroides*, I

Von


Werner Fischer und Jürgen Zapf**

Aus dem Physiologisch-Chemischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg

(Der Schriftleitung zugegangen am 22. Januar 1964)

Untersuchungen über den Galaktosestoffwechsel waren bisher durch erschwert, daß eine spezifische Mikromethode zur Direktbestimmung der Galaktose fehlte. Eine derartige Möglichkeit ergab sich, als Cooper und Mitarbeiter¹ fanden, daß der Pilz *Dactylium dendroides* eine Galaktoseoxydase an das Kulturmedium abgibt. Horecker und Mitarbeiter konnten zeigen, daß das kupferhaltige Ferment in Anwesenheit von Luftsauerstoff Galaktose an C-6 oxydiert, wobei D-galaktose Hexodialdose und H_2O_2 entstehen³⁻⁵. Das Ferment greift neben freier und pyranosidisch gebundener D-Galaktose nur verwandte Verbindungen wie z. B. D-Talose, 2-Desoxy-D-galaktose, D-Galaktosamin und N-Acetyl-D-galaktosamin an, während D-Galaktose-phosphatester, L-Galaktose sowie Verbindungen mit Glucose- und Mannosekonfiguration nicht umgesetzt werden⁴. Die Spezifität macht das Ferment für quantitative Bestimmungen von Galaktose oder deren Derivaten geeignet.

Die Galaktoseumsetzung läßt sich im gekoppelten Fermenttest mit Hilfe von Peroxydase (EC 1.11.1.7) und einem Chromogen verfolgen, wobei die Peroxydase das entstandene H_2O_2 für die Oxydation des Chromogens zum Farbstoff verwendet, der dann mit dem Photometer gemessen wird:



* D-Galaktose:Sauerstoff-Oxydoreduktase, EC 1.1.3.9.

** D 29.

¹ J. A. D. Cooper, W. Smith, M. Bacila u. H. Medina, J. biol. Chemistry **234**, 445 [1959].

² Der Pilz wurde ursprünglich für *Polyporus circinatus* Fr. gehalten und erst kürzlich als *Dactylium dendroides* identifiziert (M. K. Nobles u. C. Madhosingh Biochem. biophysic. Res. Commun. **12**, 146 [1963]).

³ G. Avigad, C. Asensio, D. Amaral u. B. L. Horecker, Biochem. biophysic. Res. Commun. **4**, 474 [1961].

⁴ G. Avigad, D. Amaral, C. Asensio u. B. L. Horecker, J. biol. Chemistry **237**, 2736 [1962].

⁵ D. Amaral, L. Bernstein, D. Morse u. B. L. Horecker, J. biol. Chemistry **238**, 2281 [1963].

Die bisherigen Untersucher übernahmen als Chromogen Di-*o*-anisidin aus der analogen Glucosebestimmung mit Glucoseoxydase (EC 1.3.4). In der vorliegenden Arbeit wird nachgewiesen, daß Di-*o*-anisidin die von der Galaktoseoxydase katalysierte Reaktion kompetitiv hemmt. Auf der Suche nach einem geeigneten Chromogen fanden wir unter den Substraten der Peroxydase *o*-Kresol, das sich im gekoppelten Fermenttest zur quantitativen Bestimmung von Galaktose eignet und auch für kinetische Untersuchungen an der Galaktoseoxydase zu bevorzugen ist.

Methodik

Materialien: Meerrettichperoxydase und Glucoseoxydase-Testgemisch wurden von Boehringer & Soehne (Mannheim), Galaktose (chromatographisch rein) von Sigma Corporation und *o*-Kresol (für Chromatographie) von Merck bezogen. Kulturen des Pilzes *Dactylium dendroides* erhielten wir von Herrn Professor Dr. B. L. Horecker, New York, dem wir auch an dieser Stelle herzlichst danken möchten.

Darstellung der Galaktoseoxydase: Bei der Züchtung des Pilzes und der Darstellung des Fermentes folgten wir im wesentlichen dem von Horecker⁴ angegebenen Verfahren. Der Pilz wurde auf Bierwürze-Schräggagar fortlaufend gezüchtet, wovon zur Gewinnung des Fermentes in Subkultur und Hauptkultur abgeimpft wurde. Das hierbei verwendete Wachstumsmedium enthielt 0,9% KH_2PO_4 (wasserfrei), 0,8% Na_2HPO_4 (wasserfrei), 0,2% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 0,02% MgSO_4 , 0,0008% MnSO_4 , 0,1% NH_4NO_3 und 0,1% Hefeextrakt sowie 1,5% D-Glucose oder D-Galaktose. Die Züchtung im flüssigen Medium erfolgte bei 30° unter kreisförmigen Schüttelbewegungen (Frequenz 150/Min.).

Die Darstellung des Fermentes gestaltet sich besonders einfach, da dieses vom Pilz in das Kulturmedium abgegeben wird. Nach 24- bis 48stdg. Wachstum der Hauptkultur filtriert man die Kulturflüssigkeit vom Mycel mittels Gaze ab, versetzt 1 l mit 10 g Cellulosepulver und gibt im Verlauf von etwa 2 Stdn. unter ständigem Rühren 700 g Ammoniumsulfat zu. Der Niederschlag wird auf einer Nutsche (Filter: Machery, Nagel Nr. 710) gesammelt, auf eine Säule von 2 cm Durchmesser gebracht und mit 100 cm³ 60% gesätt. Ammoniumsulfatlösung unter Druck gewaschen. Dann wird das Ferment mit 60—100 cm³ 0,1m Phosphatpuffer (pH 7) wiederum unter Druck eluiert. Im Eluat wird das Ferment durch Sättigung mit Ammoniumsulfat ausgefällt und bei 12000 U./Min. abzentrifugiert. Der in 10 cm³ 0,1m Phosphatpuffer (pH 7) aufgenommene Niederschlag wird über Nacht bei 4° gegen 0,02m Phosphatpuffer (pH 7) dialysiert. Schließlich befreit man die dialysierte Lösung von inerten Eiweißen und Farbstoffen über eine Säule von DEAE-Cellulose, die mit 0,02m Phosphatpuffer (pH 7) vorbehandelt wird. Das klare Eluat verwendeten wir als Fermentlösung für unsere Untersuchungen.

Das Ferment ist bei —20° ohne nennenswerten Aktivitätsverlust 6 Monate und länger haltbar. Die Aufbewahrung kann auch nach Gefriertrocknung in Pulverform erfolgen.

Für die Messung der Fermentaktivität wurde in der vorliegenden Arbeit noch durchweg Di-*o*-anisidin als Chromogen verwendet. Der Ansatz (2 cm³) enthielt: 1,7 cm³ Phosphatpuffer (0,1m, pH 7, 170 γ Peroxydase), 0,2 cm³ 0,25m Galaktoselösung, 0,1 cm³ Galaktoseoxydaselösung (gegebenenfalls verdünnt) und 0,005 cm³ Di-*o*-anisidinlösung (6,6 mg pro 1 cm³). Als Leerwert wurde für alle Messungen ein Ansatz ohne Galaktose mitgeführt. Nach 10 Min. Inkubation bei 30° wurde im genannten Ansatz bei einer Schichtdicke von 1 cm die Extinktion im Zeiss-Spektralphotometer bei 436 m μ abgelesen. Nach Horecker⁴ wurde als Einheit diejenige Fermentmenge gewählt, die unter diesen Bedingungen eine Extinktion von 1,0 ergibt.

Die Ansätze zu unseren Versuchsreihen werden jeweils in den Legenden der betreffenden Abbildungen beschrieben.

Ergebnisse und Diskussion

Versuche mit Di-*o*-anisidin

Bei Verwendung von Di-*o*-anisidin machten wir die Beobachtung, daß die Farbstoffbildung bei gleicher Galaktose- und Fermentkonzentration stark von der Menge an zugesetztem Chromogen abhängig ist. Systematische Untersuchungen führten zu den Ergebnissen in Abb. 1. Zwischen Extinktion und Galaktosekonzentration besteht keine lineare Beziehung. Außerdem nimmt die Extinktion für ein und dieselbe Galaktosekonzentration in sehr starkem Maße mit der Menge des zugegebenen Chromogens ab. Bei Betrachtung der Einzelkurven fällt auf, daß das Chromogen bei niedrigen Galaktosekonzentrationen eine wesentlich stärkere Hemmung auf die Farbstoffentwicklung ausübt als bei hohen. Wir vermuteten daher eine kompetitive Hemmung durch Di-*o*-anisidin. Zur Analyse des Hemmungstyps wurde die Farbstoffentwicklung für eine Galaktoseverdünnungsreihe bei Zugabe verschiedener Chromogenkonzentrationen untersucht. Trägt man den reziproken Wert der nach 15 Min. Versuchsdauer gemessenen Extinktion nach Lineweaver und Burk⁶ gegen den reziproken Wert der Galaktosekonzentration auf, so erhält man Gerade unterschiedlicher Steilheit, die im gleichen Punkt die Ordinate schneiden, was bei kompetitiver Hemmung zu erwarten war (Abb. 2).




Abb. 1. Hemmung der Farbstoffbildung im Galaktoseoxydase-Peroxydase-System durch steigende Mengen an Di-*o*-anisidin. (a = 13,2 γ, b = 66 γ, c = 132 γ Di-*o*-anisidin pro Ansatz.) In jeder der drei Versuchsreihen wurde 1 cm³ Phosphatpuffer (0,1M, pH 7), der 0,05 mg Peroxydase und die entsprechende Chromogenmenge enthielt, mit 0,04 cm³ einer Galaktoseverdünnungsreihe und 0,02 cm³ Galaktoseoxydaselösung (8 Einheiten) versetzt und 30 Min. bei 25° inkubiert.

⁶ H. Lineweaver u. D. Burk, J. Amer. chem. Soc. **56**, 658 [1934].




Abb. 2. Kompetitive Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion durch Di-o-anisidin. (a = 66 γ , b = 33 γ , c = 19,8 γ Di-o-anisidin pro Ansatz.) 0,8 cm³ einer Galaktoseverdünnungsreihe wurden mit 0,1 cm³ Phosphatpuffer (0,1M, pH 7; enthaltend 80 γ Peroxydase), 0,01 cm³ Galaktoseoxydaselösung (0,3 Einheiten) und 0,03 cm³ einer entsprechenden Di-o-anisidinlösung 10 Min. bei 25° inkubiert. Ordinate: Reziproke Extinktion; berechnet für 15 Min. Versuchsdauer.




Abb. 3. Der Einfluß der Konzentration von Di-o-anisidin (a = 66 und 132 γ , b = 13,2 γ pro Ansatz) und o-Kresol (c = 44 γ , d = 440 γ pro Ansatz) auf die Glukoseoxydase-Peroxydase-Reaktion. 1 cm³ Phosphatpuffer-Enzymlösung (Boehringer) wurden mit 0,04 cm³ einer Glukoseverdünnungsreihe und der entsprechenden Chromogenmenge 30 Min. bei 25° inkubiert.

Da das Chromogen im gekoppelten Fermenttest mit Glukoseoxydase-Peroxydase keine Hemmwirkung zeigt (Abb. 3), kann Di-o-anisidin nicht an der Peroxydase, sondern muß an der Galaktoseoxydase angreifen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Galaktoseoxydase

im Gegensatz zur flavinhaltigen Glucoseoxydase pro Molekül 1 Gramm atom fest gebundenes Kupfer enthält, das für die Fermentaktivität verantwortlich ist⁵. Wir vermuten daher, daß Di-*o*-anisidin über seine beiden Aminogruppen mit dem Fermentkupfer eine reversible Komplexbildung eingeht und, dem kompetitiven Hemmungstyp nach zuschließend mit der Galaktose bei der Bindung am Fermentmolekül konkurriert.

Versuche mit *o*-Kresol

Die Kurven in Abb. 1 zeigen, daß Di-*o*-anisidin für die quantitative Galaktosebestimmung wenig geeignet ist, da vor jeder Messung eine Eichkurve für die betreffende Fermentaktivität angelegt werden muß.




Abb. 4. Absorptionsspektrum von mit Peroxydase oxydiertem (a) und nicht oxydiertem (b) *o*-Kresol. Für a wurde *o*-Kresol im Peroxydase-Galaktoseoxydase-System vollständig oxydiert. Die Messung von b erfolgte im gleichen Ansatz, der jedoch keine Galaktose enthielt. Für beide Messungen wurde als Leerwert der gleiche Ansatz ohne Galaktose und *o*-Kresol verwendet.

Außerdem ist die Messung bei niedriger Galaktosekonzentration durch die starke Hemmung sehr erschwert und mit einem großen Fehler behaftet. Wir suchten daher nach einem neuen Chromogen und fanden *o*-Kresol als für unsere Zwecke geeignet. *o*-Kresol wird durch Meerrettichperoxydase in Anwesenheit von H_2O_2 in ein lindgrünes Oxydationsprodukt umgesetzt, das ein scharfes Absorptionsmaximum bei einer Wellenlänge von $410\text{ m}\mu$ aufweist (Abb. 4). Der Vorteil von *o*-Kresol liegt darin, daß, wie aus Abb. 5 ersichtlich, die Extinktion über einen weiten Bereich linear proportional zur Galaktosekonzentration ansteigt. Bei Erhöhung der Konzentration von *o*-Kresol kommt es zwar gleichfalls zu einem Rückgang der Farbentwicklung, doch handelt es sich dabei um eine nicht kompetitive Hemmung (Abb. 6), die damit die Brauchbarkeit des Chromogens für die Galaktosebestimmung in keiner Weise beeinträchtigt. In der Hemmwirkung besteht ein Unterschied gegenüber Di-*o*-anisidin auch insofern als diese im Glucoseoxydase-Peroxydase-System gleichfalls nachweisbar ist (Abb. 3).

Ein Beispiel für die Brauchbarkeit von *o*-Kresol für die Bestimmung kleiner Galaktosemengen gibt Abb. 7. Es lassen sich in dem beschriebenen Ansatz Mengen von etwa $2\text{--}80\text{ }\gamma$ erfassen, was einer Galaktose-




Abb. 5. Farbstoffbildung in Abhängigkeit von der Galaktosekonzentration bei verschiedenen Konzentrationen an *o*-Kresol. (a = $44\text{ }\gamma$, b = $220\text{ }\gamma$, c = $440\text{ }\gamma$ *o*-Kresol pro Ansatz.) Ansatz und Inkubation wie in Abb. 1, jedoch wurden statt 8 nur 4 Einheiten Galaktoseoxydase verwendet.




Abb. 6. Nicht kompetitive Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion durch *o*-Kresol. ($a = 1100 \gamma$, $b = 440 \gamma$, $c = 110 \gamma$ *o*-Kresol pro Ansatz.) Ansatz und Inkubation wie in Abb. 2. Die Michaelis-Konstante wurde aus dem 10-Min. Versuch zu $1,7 \cdot 10^{-2} m$ ermittelt, bei Extrapolation auf die Anfangsgeschwindigkeit (vgl. hierzu Legende von Abb. 7) zu $2,3 \cdot 10^{-2} m$. Ordinate: Reziproke Extinktion nach 10 Min. Versuchsdauer.

konzentration in der Untersuchungslösung von 0,23–10,3 mg/100 cm³ entspricht. Im gleichen Ansatz lassen sich selbstverständlich auch Galaktoselösungen höherer Konzentrationen messen, wenn vorher eine entsprechende Verdünnung der Untersuchungslösung erfolgt. Geht man anstatt zu verdünnen, mit der Menge an Galaktoseoxydase zurück, dann lassen sich nach den Versuchen in Abb. 5 in unserem Ansatz auf dem geraden Teil der Kurve Galaktosemengen bis 200 γ erfassen. Diese Galaktosekonzentration von 200 γ pro 1,06 cm³ Ansatz, d. i. etwa $10^{-3} m$, scheint den absoluten Grenzwert auf dem geraden Teil der Kurve darzustellen, da auch bei weiterer Zugabe von *o*-Kresol und Peroxydase die lineare Beziehung zwischen Galaktosekonzentration und Extinktion nicht über diesen Wert hinausgeht. Offenbar fällt von da an die Sättigungskinetik der Galaktoseoxydase zu stark ins Gewicht.

Die kompetitive Hemmung macht Di-*o*-anisidin für die Bestimmung der Michaelis-Konstanten unbrauchbar (vgl. Abb. 2), während *o*-Kresol nach den Untersuchungen in Abb. 6 auch hierfür geeignet ist. Wir fanden für Galaktose eine Michaelis-Konstante von $2,3 \cdot 10^{-2} m$, die mit dem von Cooper¹ auf manometrischem Weg ermittelten Wert von $2,1 \cdot 10^{-2} m$ gut übereinstimmt.




Abb. 7. Zur quantitativen Bestimmung kleiner Galaktosemengen. 0,75 cm³ einer Galaktoseverdünnungsreihe (0,3 bis 9,6 mg/100 cm³) wurden mit 0,1 cm³ Phosphatpuffer (0,1M, pH 7; enthaltend 55 γ o-Kresol und 40 γ Peroxydase) und 0,05 cm³ Galaktoseoxydaselösung (15 Einheiten) 30 Min. bei 25° im Thermostaten inkubiert.

Die Brauchbarkeit von o-Kresol für die Bestimmung der Aktivität der Galaktoseoxydase geht aus Abb. 8 hervor.

Zur technischen Durchführung sei noch vermerkt, daß in allen gekoppelten Fermenttesten, in denen Peroxydase verwendet wird, die Trocknung der Pipetten und sonstigen Glassachen mit Äther zu vermeiden ist, da die im Äther leicht entstehenden organischen Peroxyde durch die Peroxydase umgesetzt werden⁷ und zu beträchtlichen Fehlern

⁷ Vgl. K. G. Stern, Nature [London] **136**, 335 [1935]; B. Chance, Arch. Biochemistry **21**, 416 [1949].




Abb. 8. Proportionalität zwischen Anfangsgeschwindigkeit ($\Delta E_{t \rightarrow 0}$) und Fermentkonzentration. 0,75 cm³ einer 600 mg/100 cm³ Galaktoselösung wurden mit 0,05 cm³ einer Verdünnungsreihe von Galaktoseoxydase (1,0—0,0625 Einheiten) und 0,1 cm³ Phosphatpuffer (0,1m, pH 7; enthaltend 110 γ o-Kresol und 80 γ Peroxydase) 30 Min. bei 25° inkubiert und die Extinktion in Abständen von 5 Min. gemessen. Aus dem zeitlichen Verlauf wurde jeweils die Anfangsgeschwindigkeit mit einer noch unveröffentlichten Methode ermittelt.

führen können. Die Sicherheit der Meßergebnisse läßt sich dadurch erhöhen, daß man den Ansatz ohne Galaktoseoxydase 10—15 Min. vorinkubiert und durch Ablesung der Extinktion am Anfang und Ende dieser Zeitspanne auf eventuelle Farbentwicklung achtet.


Zusammenfassung

Di-o-anisidin hemmt die Reaktion der Galaktoseoxydase aus *Dactylium dendroides* kompetitiv und ist daher im gekoppelten Fermenttest mit Peroxydase für kinetische Untersuchungen der Galaktoseoxydase oder für quantitative Bestimmungen der Galaktose ungeeignet. Als brauchbares Chromogen wurde o-Kresol gefunden, bei dessen Verwendung man über einen weiten Bereich eine lineare Beziehung zwischen Extinktion und Galaktosekonzentration erhält. Die Messung erfolgt beim Absorptionsmaximum des oxydierten o-Kresols, das bei einer Wellenlänge von 410 m μ liegt. o-Kresol kann auch für kinetische Untersuchungen an der Galaktoseoxydase sowie für die Messung der Fermentaktivität verwendet werden.

Summary

Galactose oxidase from *Dactylium dendroides* is inhibited competitively by di-*o*-anisidine, which is therefore unsuitable for the coupled enzyme test with peroxidase, kinetic studies with galactose oxidase and the quantitative determination of galactose. *o*-Cresol was found to be a suitable chromogen, giving a linear relationship between extinction and galactose concentration over a wide range. Measurements are made at 10 m μ , the absorption maximum of oxidised *o*-cresol. *o*-Cresol can be used for kinetic experiments on galactose oxidase and for the measurement of enzyme activity.

Dr. W. Fischer, Physiologisch-Chemisches Institut der Universität, 852 Erlangen, Wasserturmstraße 3.



Quantitative Bestimmung der Galaktose mittels Galaktoseoxydase*
aus *Dactylium dendroides*, II

Messung der Galaktosekonzentration in Serum und Harn

Von

Werner Fischer und Jürgen Zapf**

Quantitative Bestimmung der Galaktose mittels Galaktoseoxydase aus *Dactylium dendroides*, II¹

Messung der Galaktosekonzentration in Serum und Harn

Von

Werner Fischer und Jürgen Zapf**

Aus dem Physiologisch-Chemischen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg

(Der Schriftleitung zugegangen am 10. August 1964)

Kürzlich berichteten wir über einen gekoppelten Fermenttest zur quantitativen Bestimmung der D-Galaktose. In diesem wird die Galaktose durch die Galaktoseoxydase aus *Dactylium dendroides* oxydiert und das hierbei entstehende Wasserstoffperoxyd unter Verwendung von *o*-Kresol als Chromogen mittels Peroxydase gemessen. Zwischen Galaktosekonzentration und Farbentwicklung besteht über einen weiten Bereich eine lineare Beziehung¹.

Bei der Galaktosebestimmung in Serum und Harn fanden wir im Vergleich zur Messung in rein wäßriger Lösung die Extinktionswerte stark erniedrigt. De Verdier und Hjelm², welche im Serum einen ähnlichen Hemmeffekt feststellten, legten zur Umgehung dieser Schwierigkeit vor Galaktosebelastungsproben mit dem Nüchternserum der betreffenden Versuchsperson eine Galaktose-Eichkurve an. Abgesehen von der Aufwendigkeit werden hierbei Konzentrationsänderungen der hemmenden Substanzen während der Versuchsdauer nicht erfaßt, wodurch die Methode ihren Vorteil der direkten Galaktosebestimmung verliert. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit Auffindung und Eliminierung der hemmenden Substanzen. Es gelang dadurch, im Serum auch Galaktosemengen unter 5 mg/100 cm³, wie sie nach oralen Lactosgaben auftreten³, zu erfassen, was mit den bisherigen Verfahren, welchen nach Entfernung der Glucose mittels Hefe oder Glucoseoxydase (EC 1.1.3.4) die Galaktose mit der Restreduktion bestimmt wurde, unmöglich war⁴.

Da verschiedene der hemmenden Substanzen die Peroxydase-Reaktion beeinflussen, sind unsere Untersuchungen auch für die Bestimmung der Glucose mit Glucoseoxydase von Interesse.

Abb. 1 zeigt die Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion in mit Perchlorsäure enteiweißtem Serum. Die Hemmung äußert

* D-Galaktose:Sauerstoff-Oxydoreduktase, EC 1.1.3.9.

** D 29 (Auszug aus der Dissertation von J. Zapf).

¹ I. Mitteil.: W. Fischer u. J. Zapf, diese Z. **337**, 186 [1964].

² C. H. De Verdier u. M. Hjelm, Clin. chim. Acta [Amsterdam] **7**, 7 [1962].

³ J. Zapf u. W. Fischer, in Vorbereitung.

⁴ Vgl. J. C. Haworth u. J. D. Ford, Lancet **1960**, II, 794.

darin, daß bei niedrigen, in rein wäßriger Lösung noch gut meßbaren Galaktosekonzentrationen hier keine Farbentwicklung auftritt, diese bei höheren Konzentrationen mit zeitlicher Verzögerung erfolgt.




Abb. 1. Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion im Serum. Galaktosefreies Serum wurde mit bekannten Galaktosemengen versetzt, mit dem gleichen 10proz. Perchlorsäure enteiweißt und diese in Form ihres unlöslichen Kaliumsalzes entfernt. Galaktosekonzentrationen im Serum in mg/100 cm³: a = 46,8; b = 23,4; c = 11,7; d = 5,8; e = 2,9; f = 1,45.

Zur Klärung des Hemmeffektes prüften wir verschiedene Serumbestandteile gesondert hinsichtlich ihres Einflusses auf die Reaktion. Calciumionen, Harnstoff, Kreatin und Kreatinin waren in Konzentrationen, wie sie im enteiweißten Serum vorhanden sind, ohne Wirkung. Eine beträchtliche Hemmung ließ sich dagegen mit Harnsäure erzielen. Abb. 2 zeigt, daß bei Zugabe von Harnsäure die Farbentwicklung in der reinen Galaktoselösung wie im Serum mit einer zeitlichen Verzögerung verläuft. Sobald der anfängliche Hemmeffekt überwunden ist, verläuft sie annähernd die gleiche Geschwindigkeit wie in der reinen Galaktosevergleichslösung. Bei verschiedenen Galaktosekonzentrationen, wie aus Abb. 3 ersichtlich, die Farbentwicklung jeweils um etwa denselben absoluten Wert vermindert, so daß die Eichkurve eine Parallelschiebung erfährt.

Aus dem Reaktionsverlauf (Abb. 1 und 2) und der Konstanz der Hemmung (Abb. 3) vermuteten wir, daß die Harnsäure durch die Peroxydase oxydiert wird, eine höhere Affinität zum Ferment besitzt als Resorol und damit zu Beginn der Reaktion durch Verbrauch des Wasserstoffperoxyds die Oxydation des Leukofarbstoffes verhindert. Für eine Beeinflussung der Peroxydase-Chromogen-Reaktion sprach außerdem




Abb. 2



Abb. 3

Abb. 2. Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion durch Harnsäure. Die Galaktosekonzentration ist an den Kurven in mg 100 cm³ angegeben. gestrichelte Kurven: Zusatz von 0,3 mg Harnsäure pro 100 cm³ Galaktoselösung.

Abb. 3. Konstanz der Harnsäurehemmung bei verschiedenen Galaktosekonzentrationen. Ausgezogene Kurve: Galaktoseverdünnungsreihe ohne Harnsäure; gestrichelte Kurve: Galaktoseverdünnungsreihe mit 0,3 mg Harnsäure je 100 cm³.

der Nachweis einer analogen Hemmwirkung der Harnsäure im Glucoseoxydase-Peroxydase-System. Die Umsetzung der Harnsäure durch Peroxydase wird durch die in Abb. 4 wiedergegebenen Versuche bewiesen. Man erkennt die Oxydation aus dem Abfall der beim Absorptionsmaximum der Harnsäure (290 mμ) gemessenen Extinktion.

Wir fanden die Oxydierbarkeit durch Peroxydase auf Harnsäure beschränkt, da sich in analogen Versuchen die Purine Xanthin, Hypoxanthin und Guanin sowie die Pyrimidine Uracil und Thymin als unangreifbar erwiesen. Bei Durchsicht der Literatur stellten wir fest, daß Canellakis, Tuttle und Cohen⁵ bei Untersuchungen über die Substrate der Peroxydase gleichfalls eine Umsetzung der Harnsäure fanden und als Reaktionsprodukte Allantoin und Harnstoff nachwiesen.

Für die Galaktosebestimmung im Serum muß daher die Harnsäure entfernt werden. Wir behandelten zu diesem Zwecke das mit Trichlor

⁵ E. S. Canellakis, A. L. Tuttle u. P. P. Cohen, J. biol. Chemistry 207, 397 [1955].




Abb. 4. Oxydation der Harnsäure durch Peroxydase. Harnsäurelösung (1,7 mg pro 100 cm³) wurde mit 0,1*M* Phosphatpuffer, pH 7, und Peroxydase versetzt. Zu Versuchsbeginn bei a Zugabe von 0,00085proz. Wasserstoffperoxydlösung, bei b zur Entwicklung von Wasserstoffperoxyd Zugabe von Galaktose und Galaktoseoxydase. c wie a, jedoch Inaktivierung der Peroxydase durch 20 Min. Erhitzen bei 100°.

isigsäure entweißte Serum mit einem getrockneten Mischaustauscher, durch welchen sowohl das Enteiweißungsmittel als auch die Harnsäure vollständig eliminiert werden. Abb. 5 gibt die Brauchbarkeit dieses Verfahrens zur Galaktosebestimmung im Serum wieder: Man findet bei Zusatz von Galaktose zum an sich galaktosefreien Serum dieselben Extinktionswerte wie für die analog behandelte Galaktosevergleichslösung.

Die Behandlung mit Trichloressigsäure und Mischaustauscher hat außerdem den Vorteil, daß eventuell im Serum vorhandene L-Ascorbinsäure, die wie Harnsäure als Substrat der Peroxydase die Reaktion stört, auf nicht näher untersuchte Weise eliminiert wird.

Da bekannt war, daß Glutathion in reduzierter Form die Glucoseoxydase-Peroxydase-Reaktion hemmt⁶, prüften wir zur Analyse des Hemmeffektes den Einfluß auf unsere Fermentkette. Nach Abb. 6 hat die Hemmwirkung denselben Charakter wie bei Harnsäure, so daß offensichtlich auch reduziertes Glutathion als Substrat der Peroxydase mit dem Chromogen konkurriert. Da Glutathion in beträchtlicher Menge in den Erythrocyten vorkommt, muß seine Wirkung bei Galaktose-

⁶ F. W. Falses, J. A. Russel u. J. N. Fain, Clin. Chem. [New York] 7, 9 [1961].




Abb. 5. Messung der Galaktosekonzentration. ● : in mit Galaktose versetztem, n. Trichloressigsäure entweißtem und mit Misch austauscher behandeltem Serum. ○ : in einer entsprechenden und auf die gleiche Weise behandelten wäßrigen Galaktoselösung, die 1% Kochsalz enthält. 0,75 cm³ der vorbehandelten Untersuchungslösungen wurden mit 0,1 cm³ 0,2m Phosphatpuffer, pH 7 (enthaltend 40% Peroxydase und 100% o-Kresol) und 0,05 cm³ Galaktoseoxydase (11 Einh.) bei 25° inkubiert. Ablesung der Extinktion bei a nach 10 Min., bei b nach 20 Min. und bei c nach 30 Min. Die Gerade c wurde mit Hilfe zweier berechneter Punkte (durch Kreuze gekennzeichnet) konstruiert. Mittlere Abweichung (σ) der Meßpunkte von der konstruierten

Geraden $\pm 2,3\%$.

messungen im Vollblut berücksichtigt werden. Nach vorläufigen Untersuchungen mit Glutathion in isotonischer Kochsalzlösung ist auch hier eine Entfernung durch den Misch austauscher möglich.

Im Harn wird die Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion noch wesentlich stärker als im Serum gehemmt. Nach Abb. 7 kommt der Harnsäure der größte Anteil an der Hemmwirkung zu. Außerdem wurde für die im Vergleich zum Serum hohen Konzentrationen an Kochsalz und Harnstoff eine relativ geringfügige, nicht kompetitive Hemmung nachgewiesen. Wesentlich stärker und, dem Kurvenverlauf nach zu schließen, offenbar kompetitiv, hemmt Kreatinin. Mit Ausnahme der




Fig. 6. Hemmung der Galaktoseoxydase-Peroxydase-Reaktion durch reduziertes Glutathion. Galaktosekonzentration: 5,33 mg/100 cm³ (ausgezogene Kurven), 0,53 mg/100 cm³ (gestrichelt). Der Zusatz von reduziertem Glutathion ist an den Kurven in mg/100 cm³ angegeben.

Harnsäure scheinen die genannten Harnbestandteile an der Galaktoseoxydase anzugreifen, da die Glucoseoxydase-Peroxydase-Reaktion durch ähnlich hohe Konzentrationen an Harnstoff und Kreatinin nur um 10 bzw. 6%, durch Kochsalz überhaupt nicht gehemmt wird.

Auch im Harn verwendeten wir zur Elimination der störenden Substanzen mit Erfolg einen Misch-austauscher, durch welchen bei geeigneter Verdünnung des Harns Kochsalz sowie Harnsäure vollständig, Harnstoff wenigstens teilweise entfernt wird. Durch den Kationenaustauscher läßt sich auch das stark hemmende Kreatinin quantitativ entfernen.

Zur Auffindung der erforderlichen Bedingungen behandelten wir Harnen mit Galaktose versetzten Normalharn vom spezif. Gewicht 1020 in verschiedenen Verdünnungen mit dem Misch-austauscher und stellten fest, daß bei einer Verdünnung von 1:5 und 1:10 noch eine geringe Hemmung der Reaktion von 5 bzw. 3% fest. Im 1:14 verdünnten Harn trat keine Hemmung mehr auf, so daß eine Verdünnung von 1:20 als ausreichender Sicherheitsfaktor auch für konzentrierte Harne erscheint. Die unter diesen Bedingungen exakte Meßbarkeit niedriger Galaktosekonzentrationen




Abb. 7. Einfluß verschiedener Harnbestandteile auf die Galaktoseoxydase-Peroxidase-Reaktion. a = reine Galaktoselösung, b = Galaktoselösung mit 1,44% Kochsalz, c = mit 2,4% Harnstoff, d = mit 0,05% Kreatinin, e = mit 0,2% Kreatinin, f = mit 0,15% Harnsäure. Die Konzentrationen der zugesetzten Substanzen entsprechen etwa mittleren bis maximalen Werten im Harn.

trationen geht aus Abb. 8 hervor. Die Nachprüfung ergab, daß in diesem Versuch durch den Austauscher Kochsalz, Harnsäure und Kreatinin vollständig, der Harnstoff zu 56% entfernt war. Die geringe Harnstoffkonzentration von 32 mg/100 cm³ (2,2% der Ausgangskonzentration) ist auf die Reaktion ohne Einfluß, da sich die Hemmung durch Harnstoff erst bei über 100 mg/100 cm³ geringfügig bemerkbar macht.

Beschreibung der Versuche

Materialien: Meerrettich-Peroxydase und Glucoseoxydase-Testgemische wurden von Boehringer (Mannheim), Urastrat von Gödecke, Galaktose (chromatographisch rein), Xanthin, Hypoxanthin, Guanin, Uracil und Thymin von Sigma Chemical Corporation, o-Kresol, Kreatinin und Harnsäure (für wissenschaftliche Zwecke) von Merck, Dowex 1X10 (200 bis 400 mesh, Cl⁻-Form, p. A.) und Dowex 50 WX8 (H⁺-Form, p. A.) vom Serva-Entwicklungslabor (Heidelberg) bezogen.

Die Züchtung des Pilzes und Darstellung des Fermentes erfolgte wie in der vorausgehenden Mitteilung¹. Es erwies sich als zweckmäßig, den Pilz nicht auf Galaktose, sondern auf Glucose zu züchten, da offenbar durch Oxydation der Galaktose Wasserstoffperoxyd entsteht, durch welches erwiesenermaßen die Oxydase inaktiviert wird.

Messung der Aktivität der Galaktoseoxydase: 0,05 cm³ Galaktoseoxydaselösung werden mit 0,75 cm³ einer Lösung, die 600 mg Galaktose je 100 cm³ enthielt, und 0,1 cm³ 0,2*m* Phosphatpuffer, pH 7 (enthaltend 40 γ Peroxydase und 100 γ o-Kresol) bei 25° 30 Min. inkubiert. Dabei wird alle 5 Min. die Extinktion bei 410 mμ und einer Schichtdicke von 1 cm gegen einen Leerwert gemessen, d




Abb. 8. Zur quantitativen Galaktosebestimmung im Harn. ● : Messungen in mit Galaktose versetztem und mit Austauscher behandeltem Harn (spezif. Gewicht 1,22; 1:20 verdünnt), ○ : Messungen in einer entsprechenden und analog behandelten wäßrigen Galaktoselösung, die 1% Kochsalz enthielt. Abszisse: mg Galaktose je 100 cm³ unverdünnter Ausgangslösung. 0,75 cm³ der vorbehandelten Untersuchungslösungen wurden mit 0,1 cm³ 0,2*m* Phosphatpuffer, pH 7 (enthaltend 40 γ Galaktoseoxydase und 100 γ *o*-Kresol) und 0,05 cm³ Galaktoseoxydaselösung (28 Einh.) 25 Min. bei 25° inkubiert.

Die gesamte Ansatz ohne Galaktose enthält, und aus der so erhaltenen Zeitkurve die anfängliche Extinktionsänderung ($\Delta E_{t \rightarrow 0}$) ermittelt¹. Als Einheit wird diejenige Fermentmenge gewählt, die für $\Delta E_{t \rightarrow 0}$ einen Wert von 0,1 ergibt.

Behandlung des Austauschers: Der Kationenaustauscher (Cl⁻-Form) wird mit 8proz. NaOH-Lösung in die OH⁻-Form übergeführt, der Anionenaustauscher in der bereits vorliegenden H⁻-Form verwendet. Beide Ionenaustauscher werden getrocknet, da bei Verwendung der käuflichen Suspension unkontrollierbare Verdünnungen der Untersuchungslösung auftreten können. Am besten bewährte ist nach Absaugen des Wassers eine etwa 12stdg. getrennte Trocknung beider Austauscherkomponenten bei 40° im Trockenschrank. Vor Gebrauch werden die beiden getrockneten Austauscher in einer Reibschale gut durchmischt. Da — wahrscheinlich infolge Quellung — der getrocknete Austauscher eine Konzentrierung der Galaktoselösungen von etwa 10% bewirkt, ist auch der Galaktosestandardwert mit dem Austauscher zu behandeln.

Bestimmung der Galaktose in Serum und Harn: 0,6 cm³ Serum werden mit 0,6 cm³ 8proz. Trichloressigsäure enteiweißt. Nach Abzentrifugieren des Niederschlages werden 0,8 cm³ der überstehenden Lösung mit dem gleichen Vol. an dest. Wasser verdünnt und mit 0,4 g Misch-austauscher (7 Teile Anionenaustauscher und 3 Teile Kationenaustauscher) versetzt und kräftig geschüttelt. Der Austauscher wird abzentrifugiert (4500 U./Min., 10 Min.) und der Überstand durch ein Filter (Durchmesser 6 mm, Schleicher & Schüll Nr. 597) gegeben. 0,75 cm³ des Filtrates

werden, wie in Abb. 5 angegeben, mit Puffer-Peroxydase-Chromogen- und Galaktoseoxydase-Lösung inkubiert. Die Messung der Extinktion erfolgt im Spektraphotometer bei 410 m μ (Schichtdicke 1 cm) gegen einen Leerwert, der den gesamten Ansatz, aber an Stelle des Serums das gleiche Vol. an dest. Wasser enthält.

Für die Galaktosebestimmung im Harn wird dieser 1:20 verdünnt und dann 2 cm³ mit 0,5 g Mischaustauscher (gleiche Teile Anionen- und Kationenaustauscher) versetzt. Der Austauscher wird wie oben durch Zentrifugieren und Filtrieren entfernt und die so gewonnene Untersuchungslösung, wie in Abb. 8 beschrieben, inkubiert.

Zur Berechnung der Galaktosekonzentration dient ein Galaktosestandardwert, zu dessen Ermittlung eine Lösung, die 20 mg Galaktose je 100 cm³ enthält wie das Serum bzw. der Harn behandelt und inkubiert wird. Die Galaktosestandardlösung enthält 1% Kochsalz, wodurch eine Retention des Zuckers am Anionenaustauscheranteil verhindert wird. Durch ihre lineare Beziehung zur Extinktion (Abb. 5) errechnet sich die Galaktosekonzentration für Serum und Harn wie folgt:

$$\frac{E_{\text{Serum bzw. Harn}}}{E_{\text{Standardwert}}} \cdot 20 \text{ [mg 100 cm}^3\text{]}$$

Die Methode ist auf die Erfassung geringer Galaktosekonzentrationen angepasst. Bei höheren Konzentrationen muß die Untersuchungslösung stärker verdünnt oder die Galaktoseoxydase-Menge reduziert werden. Die Galaktosekonzentration darf 200 γ nicht überschreiten, da andernfalls die lineare Beziehung zwischen Galaktosekonzentration und Extinktion nicht mehr gegeben ist¹.

Zum Nachweis der hemmenden Substanzen: Zur Prüfung auf Entfernung der Harnsäure durch den Mischaustauscher wurde das Absorptionsmaximum der Harnsäure von 290 m μ benutzt. Zum Nachweis von Kreatinin verwendet man die Jaffé-Reaktion; die Konzentration an Harnstoff wurde mittels Urastrastreifen nach entsprechender Verdünnung der Untersuchungslösung ermittelt.

Zusammenfassung

Die quantitative Galaktosebestimmung durch den gekoppelten Fermenttest mittels Galaktoseoxydase und Peroxydase wird im Serum durch die Harnsäure unmöglich, da diese als Substrat der Peroxydase Wasserstoffperoxyd verbraucht, wodurch weniger o-Kresol oxydiert wird und gegenüber der wäßrigen Vergleichslösung zu niedrige Extinktionswerte gefunden werden. Bei Messungen im Vollblut ist außerdem das in den Erythrocyten vorhandene Glutathion zu berücksichtigen, das in reduzierter Form ebenfalls als Substrat der Peroxydase wirksam ist.

Auch im Harn fällt die Störung der Reaktion durch die Harnsäure am stärksten ins Gewicht. Hier findet man außerdem auf Grund der hohen Konzentrationen eine beträchtliche kompetitive Hemmung durch Kreatinin sowie eine geringfügigere, nicht kompetitive Hemmung durch Harnstoff und Kochsalz. Die drei letztgenannten Substanzen beeinflussen die Reaktion der Galaktoseoxydase.

Die Entfernung der störenden Substanzen durch einen Mischaustauscher wird beschrieben, wodurch im Serum und Harn die Galaktosekonzentration gegen einen wäßrigen Galaktosestandardwert gemessen werden kann.

Summary

The quantitative determination of galactose by the coupled enzyme system, galactose oxidase — peroxidase, is not possible in serum, owing to the presence of uric acid. The latter is a substrate of the peroxidase; resulting utilization of hydrogen peroxide causes less *o*-cresol to be oxidized and the extinction value, compared with that of an aqueous standard, is lowered.

In determinations on whole blood, the glutathione of the erythrocytes must also be considered, since, in the reduced form, it is also a substrate for the peroxidase.

The interference by uric acid is greatest in urine. Because of its high concentration, creatinine exerts a strong competitive inhibition, while urea and sodium chloride cause a smaller, non-competitive inhibition. The latter three substances affect the galactose oxidase reaction.

The removal of interfering substances by a mixed exchanger is described. This permits the measurement of galactose in serum and urine against an aqueous galactose standard.

Dr. W. Fischer, Physiologisch-Chemisches Institut der Universität, 852 Erlangen, Wasserturmstraße 3.

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The second part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The third part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The fourth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The fifth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The sixth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The seventh part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The eighth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The ninth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science. The tenth part of the paper is devoted to a detailed discussion of the problem of the origin of life. It is shown that the problem is one of the most important and most difficult in the history of science.

Lebenslauf

Am 21.1.1940 wurde ich, Jürgen Hans Leopold Zapf, als Sohn des Heizungsingenieurs Josef Zapf und seiner Ehefrau Edith in Marienbad geboren. Nach unserer Aussiedlung im April 1946 nach Oberbayern, besuchte ich vier Jahre lang die Volksschule in Bad Aibling. Im September 1950 trat ich in die Oberrealschule Rosenheim über, wo ich im Juli 1959 das Abitur bestand. Im November 1959 immatrikulierte ich mich an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen für das Studienfach Medizin, legte im Juli 1960 das Vorphysikum und im Februar 1962 das Physikum an derselben Universität ab und beendete am 13.8.1965 in Erlangen das Medizinische Staatsexamen.

